


フルミスト点鼻薬

(経鼻弱毒性インフルエンザワクチン)

注射ワクチン（不活化ワクチン）と同様に
インフルエンザ重症化を防ぎ
一定の割合でインフルエンザの発症予防にも
役立ちます



対象：2歳から18歳
方法：1シーズン1回
(左右の鼻腔に1噴霧ずつ
合計2回噴霧)

注意点

☆副反応として

鼻づまり・鼻汁などのかぜ症状

時にインフルエンザ様の症状を起こすことがあります。

☆接種した方の鼻汁や咳の飛沫に

弱毒化されたインフルエンザウイルスが含まれます。

免疫が低下している方には感染する可能性があります。

接種後2週間程度は、

- ・点鼻後、かぜ症状がある場合はマスクの着用をおすすめします
(本人がいやがる場合などは無理をせず周りが予防するなど工夫をしてみてください)
- ・インフルエンザの検査をすると、陽性にでる場合があります

当院にてフルミストができない方

☆1週間以内に発熱があった方

☆アナフィラキシーになったことがある方

(ゼラチン・卵・予防接種)

☆喘息の方

☆免疫抑制する薬・一部の解熱剤・アスピリンなどを内服されている方

☆妊婦・免疫が低下している高齢者・6か月未満の乳児と同居されている方

数に限りがあります

早めの予約おすすめします